

Con quale frequenza dovresti sverminare il tuo gatto?



Misure preventive

- Se si osservano segmenti di tenia intorno all'ano o nelle feci, il tuo cane dovrebbe essere sverminato anche contro le tenie utilizzando praziquantel e iniziare un trattamento antipulci.
- Far esaminare regolarmente le feci del tuo cane è una buona alternativa alla raccomandazione "standard" di sverminazione.
- **Medidas higiénicas importantes para personas y animales:**
 1. Lavare accuratamente le mani (in particolare quelle dei bambini), soprattutto prima di mangiare.
 2. Lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo.
 3. Non somministrare carne cruda. Fornire sempre acqua potabile fresca.
 4. Coprire le sabbie quando non sono in uso.
 5. Raccogliere immediatamente le feci del cane, sia in giardino sia durante le passeggiate, e smaltirle nel bidone dei rifiuti indifferenziati, non nel compost. Lavarsi le mani successivamente.

Trattamento aggiuntivo

Trattamento contro i vermi tondi:

- I cuccioli dovrebbero essere sverminati a partire da 2 settimane di età, con il trattamento ripetuto ogni 2 settimane fino a 2 settimane dopo lo svezzamento. Se è presente un rischio persistente e aumentato di infezione, ad esempio nei gruppi di gioco per cuccioli, i trattamenti mensili dovrebbero continuare fino a quando il cucciolo raggiunge i sei mesi di età.
- Sverminare la femmina in allattamento al momento del primo trattamento dei cuccioli, 2 settimane dopo la nascita.
- Per ridurre la trasmissione ai cuccioli, le femmine in gravidanza possono essere trattate con lattoni macrociclici, ad esempio Milbemycin, intorno ai giorni 40 e 55 di gravidanza, oppure con fenbendazolo ogni giorno dal giorno 40 di gravidanza fino al secondo giorno dopo il parto.
- I cani con un rischio aumentato di infezione, come quelli coinvolti in sport, esposizioni, competizioni o tenuti in canili, dovrebbero essere trattati due volte, fino a 2 settimane prima e 2 settimane dopo l'evento. Nei canili, la sverminazione dovrebbe essere effettuata mensilmente oppure in base ai risultati di un esame fecale mensile.
- I cani da lavoro, terapia, soccorso, polizia, dovrebbero essere sverminati mensilmente secondo lo schema decisionale oppure, quando l'esposizione alla tenia della volpe è bassa, trattati in base ai

risultati di un esame fecale mensile.

- I cani che vivono con bambini piccoli, di età inferiore a 5-6 anni, persone immunocompromesse o anziani, YOPI, dovrebbero, secondo lo schema decisionale, essere sverminati mensilmente oppure sottoporsi a un esame fecale mensile ed essere trattati in base ai risultati.

Trattamento contro i vermi polmonari e il verme cardiaco francese:

- I cani che tendono a mangiare lumache e/o chioccioline ed erba dovrebbero, secondo lo schema decisionale, ad esempio in base alla frequenza di ingestione di lumache o chioccioline e al livello di contaminazione ambientale, essere trattati preventivamente su base mensile.

Trattamento contro le tenie:

- I cani che viaggiano o vengono importati da aree in cui è presente la tenia della volpe dovrebbero essere trattati 4 settimane dopo l'inizio del viaggio e poi mensilmente fino a 4 settimane dopo il rientro a casa. Dopo l'importazione, sverminare immediatamente.
- Per i cani che mangiano carne cruda, resti di carcasse o animali preda, oppure che cacciano, si raccomanda di sverminare ogni 4 settimane oppure in base a esami fecali ogni 2-3 mesi.

- Sverminare se è presente un'infestazione da pulci.

- Trattamento aggiuntivo

Trattamento contro la filariosi cardiopolmonare:

- I cani che vivono in aree in cui è presente la filariosi cardiopolmonare dovrebbero ricevere un trattamento preventivo mensile contro le larve durante la stagione delle zanzare, continuando fino a 30 giorni dopo la fine della stagione delle zanzare.

Viaggi e trasporto

- I cani che viaggiano o vengono importati da aree in cui è presente la filariosi cardiopolmonare dovrebbero essere trattati entro e non oltre 30 giorni dalla partenza e poi mensilmente fino a 30 giorni dopo il rientro a casa.
- Durante la stagione delle zanzare, trattare entro 30 giorni dall'arrivo, quindi continuare mensilmente fino a 30 giorni dopo il rientro a casa.
- Import from areas where heartworm occurs: Treat immediately after import. Test for heartworm at the time of entry and retest after 6 months.

Vuoi altre informazioni dal nostro veterinario sulla sverminazione del tuo cane? Vai su www.medpets.it/sverminazione



Spiegazione sui diversi tipi di vermi

I vermi sono parassiti che possono vivere in diverse parti del corpo dell'animale. Cani e gatti possono infettarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dall'età. Possono persino infettarsi con vermi che rappresentano un rischio per l'uomo. I principali tipi di vermi sono i vermi tondi, le tenie e gli anchilostomi, i cui vermi adulti vivono nell'intestino tenue. I vermi cardiaci vivono nell'arteria polmonare e i vermi polmonari adulti vivono nei vasi tra il cuore e i polmoni. Alcuni vermi possono rappresentare un rischio per la salute umana.

Vermi tondi

I vermi tondi sono tra i parassiti più comuni riscontrati in cani e gatti. Sono chiamati vermi tondi a causa della loro forma rotonda. È possibile trovare questi vermi nell'intestino, nelle vie respiratorie, sotto la pelle, nelle cavità nasali e nei grandi vasi del cuore. I vermi tondi più comuni riscontrati in cani e gatti nel Regno Unito sono *Toxocara canis* e *Toxocara cati*.

Vermi cardiaci

Il verme cardiaco è il nome del parassita *Dirofilaria immitis*. Questo parassita può causare infezioni in cani e gatti. Sono chiamati "vermi cardiaci" perché vivono nell'arteria polmonare del cuore. Fortunatamente, queste infezioni da verme cardiaco non sono presenti nel Regno Unito, tuttavia possono essere riscontrate in animali che provengono o che hanno viaggiato nel Sud Europa.

Tenie

Le tenie hanno un ciclo vitale indiretto. Le tenie adulte vivono nell'intestino dell'ospite definitivo, ad esempio un cane o un gatto. Vi arrivano quando le tenie giovani, note anche come cisti idatidee, si insediano nell'ospite intermedio, come pecore, pulci, conigli o topi. Il cane consuma una parte di questo ospite intermedio, causando l'insediamento della cisti nel tratto gastrointestinale del cane. Qui si sviluppano in tenie adulte. Nell'ospite definitivo, le tenie difficilmente causano problemi gravi.

Verme cardiaco francese

Verme cardiaco francese (lungworm)

Il verme cardiaco francese, verme polmonare, è il nome del parassita *Angiostrongylus vasorum*. Questo parassita è in grado di infettare i cani. Questo verme vive nei vasi tra il cuore e i polmoni, da cui deriva il nome. È anche chiamato verme polmonare perché l'infezione può causare gravi danni ai polmoni. Questo parassita sta diventando sempre più comune nel Regno Unito. I cani possono infettarsi quando mangiano lumache o animali preda che portano questo verme.

Vermi polmonari

Oltre al verme cardiaco francese, i cani possono essere colpiti anche dal vero verme polmonare, *Oslerus osleri*. Questo parassita forma noduli nelle vie respiratorie più grandi dei cani e provoca sintomi come tosse secca, tosse durante l'esercizio o con i cambiamenti di temperatura, oltre a mancanza di respiro, perdita di peso e scarso appetito nei cani giovani. I cani si infettano mangiando le feci di cani infetti.

Vuoi altre informazioni dal nostro veterinario sulla sverminazione del tuo cane? Vai su www.medpets.it/sverminazione

